



United Family Healthcare
和睦家医疗

United Family New Hope Oncology Center

Tel: 861059277008(appt) Fax: 861059277021

24hrs service line: 18701620870 Email: oncology@ufh.com.cn



卡铂 (伯尔定)

概述

卡铂是一种化疗药，可用于治疗多种类型的癌症。卡铂经静脉给药，输注时间需大于60分钟，每1-4周给药一次。卡铂通常是和其他药一起合用。

食物药物相互作用：和您的医生和药师一起检查您现服用的药物，包含处方药和非处方药，包括维生素和中草药。卡铂有肾脏的副作用，它的剂量是根据实验室检查出来的肾功能的情况确定的。需要多喝水（每天2升）以减少对肾脏的损害。

可能的常见副作用

恶心，呕吐

恶心和/或呕吐可能会在给药后大概6小时发生，持续到给药后24小时。化疗前会给您服用预防恶心的药物，同时化疗结束也会给您开防治恶心呕吐的药物带回家备用。如果这些药物仍不能缓解症状，请告知您的医生或护士。

发热和/或寒颤，疲劳，出血

卡铂会减少血中白细胞，血小板和红细胞的数量。如果您有如下情况请告知您的医生或护士：(1) 您的体温超过38℃；您突然感到不舒服，即使体温正常；您出现感染的症状（这些症状可能是颤抖，喉咙痛，咳嗽，腹泻或尿频）(2) 您身上出现不能解释的瘀斑或出血（鼻衄/牙龈出血/出血点/皮疹）；(3) 如果您的红细胞数量减少，您可能会感到疲惫或喘不过气来。如果这样也请您告诉您的医生或护士。

口腔溃疡

良好的口腔卫生很重要。如果您有喉咙痛，吞咽困难，或口腔咽喉有白斑，请告知您的医生或护士帮助您采取相应的措施缓解不适。

较少见的副作用

手脚麻木或刺痛感

发生风险随年龄增加，尤其是65岁以上。如果您有感觉的改变（麻木，刺痛，系纽扣困难），请告知您的医生或护士。另外若发现任何视力或听力变化，或头晕，或意识不清，请告知您的医生或护士。

罕见副作用

过敏反应

很少发生;然而,如果您有瘙痒,恶心,胸部发紧憋闷,呼吸困难,说话或吞咽困难,新发咳嗽,脸或眼周肿,腹部疼痛或痉挛,或突然感到非常紧张或焦虑,请立即联系您的医生或护士。

如果您感觉很不舒服或发生任何严重不良反应，即使这些反应上述没有提到，请您立即直接告诉您的医生，这点非常重要。