



多西他赛（泰索帝）

概述

泰索帝是静脉给药的一个化疗药，一般输液时间为1小时。通常每周或每3周给药一次。为预防体液滞留导致的水肿，医生会给您开一个叫地塞米松的药（一种激素）。这个药的用法：一天两次，服用3天（化疗前一天，化疗当天，化疗后一天）。您需要在化疗前一天开始服用，如果没有服用，请告知护士。

药物&食物相互作用：让您的医生或药师知道您是否有饮酒史或在服用需要避免饮酒的药物。泰索帝里含酒精成分。请与您的医生和药师检查您目前正在服用的药物。这包括处方药、非处方药、维生素类以及中草药。某些抗生素和抗真菌的药也会影响泰索帝的作用(红霉素，酮康唑)。

可能的常见副作用

发热和/或寒颤，疲劳，出血	泰索帝会减少血中白细胞，血小板和红细胞的数量。如果您有如下情况请告知您的医生或护士：(1) 您的体温超过38℃；您突然感到不舒服，即使体温正常；您出现感染的症状（这些症状可能是颤抖，喉咙痛，咳嗽，腹泻或尿频）(2) 您身上出现不能解释的瘀斑或出血（鼻衄/牙龈出血/出血点/皮疹）；(3) 如果您的红细胞数量减少，您可能会感到疲惫或喘不过气来。如果这样也请您告诉您的医生或护士。（泰索帝抑制骨髓的高峰作用大概会发生在给药后第9天）
脱发	通常是指全身的毛发。您可以选择合适的假发或头巾。一般情况下，治疗结束后会恢复生长。避免将头发直接暴露于阳光下，外出可以带宽帽檐的帽子。
手脚麻木，刺痛感	如果有此不良反应请在每次治疗前告知您的医生或护士。通常治疗结束后会消失。
体液滞留	可能您的腿或脚会肿。有时候也会发生在胸部。如果有呼吸困难，头晕，或明显乏力；或腿脚肿胀，请立即告诉您的医生或护士。地塞米松可以帮助减少这些反应。
皮肤，指甲改变	皮疹也是常见的。可能是斑片状或类似风疹样的，一般出现在手或脚。通常会出现两次治疗之间，在下次治疗前通常会消失。指甲颜色有可能会发生变化。极少数情况下，指甲会脱落，但是会重新生长。
恶心，呕吐	治疗给药前您会给予预防恶心的药物，回家也会给您备防治恶心呕吐的药。按医嘱服用。药师会给您讲解药物具体用法。如果服药仍不能缓解，请告知您的医生或护士。
口腔溃疡	良好的口腔卫生很重要。如果您有喉咙痛，吞咽困难，或口腔咽喉有白斑，请告知您的医生或护士帮助您采取相应的措施缓解不适。

如果您感觉很不舒服或发生任何严重不良反应，即使这些反应上述没有提到，请您立即直接告诉您的医生，这点非常重要。

Reference: Treatment and Chemotherapy Administration Resource For The Adult Patient.. Cancer Maine Medical Center.