



注射用紫杉醇（白蛋白结合型）

概述

Abraxane是一个静脉用的化疗药。Abraxane是用于治疗对于其他化疗药反应无效或6个月内复发的晚期乳腺癌患者。Abraxane也被批准用于非小细胞肺癌和胰腺癌的治疗。Abraxane经静脉给药30分钟左右，一般每3周重复一次。

食物 & 药物相互作用: 与您的医生和药师一起审核您现在用的药。包括所有的处方和非处方药，维生素和中草药。

可能的副反应

<p>发热和/或寒颤，疲劳，出血</p>	<p>Abraxane会减少血中白细胞，血小板和红细胞的数量。如果您有如下情况请告知您的医生或护士：(1) 您的体温超过38℃；您突然感到不舒服，即使体温正常；您出现感染的症状（这些症状可能是颤抖，喉咙痛，咳嗽，腹泻或尿频）(2) 您身上出现不能解释的瘀斑或出血（鼻衄/牙龈出血/出血点/皮疹）；(3) 如果您的红细胞数量减少，您可能会感到疲惫或喘不过气来。如果这样也请您告诉您的医生或护士。</p>
<p>手脚麻木，刺痛，和/或烧灼感（神经疾病）</p>	<p>这些症状在给药后经常发生，通常在下周期给药前会好转或消失。您的医生或护士也会询问您关于手脚麻木的情况。少数情况下，我们有可能延迟化疗时间或减少剂量，以免造成严重的神经损伤。</p>
<p>脱发</p>	<p>基本上都会发生脱发。包括眉毛，睫毛和阴毛，以及头发。脱发可以在治疗开始后很快就发生，但是通常会发生在第一次化疗后14-21天。</p>
<p>口腔和/或口唇 溃疡</p>	<p>一些患者会发生口腔和/或口唇的红，变薄发亮，和/或伴有溃疡。这些症状会在给药后几天发生通常一周以内会缓解或消失。您的护士会给您一些这方面的指导和建议。如果您因为疼痛出现吞咽困难或看到口腔里有凸起的白斑，请告知您的医生或护士。</p>
<p>关节肌肉疼痛</p>	<p>这是一个常见的不良反应，通常几天之后会发生。温湿水的浸润或温水浴可能会有帮助。您也可以服用对乙酰氨基酚缓解。如果这些措施都缓解不了症状，请您告知医生。</p>
<p>恶心，呕吐，腹泻</p>	<p>有些病人会有这些症状。化疗前会给您服用预防恶心的药物，同时化疗结束也会给您开防治恶心呕吐的药物带回家备用。如果这些药物仍不能缓解症状，请告知您的医生或护士。腹泻通常会自行缓解。但是如果您24小时内有3次或3次以上的水样便，请告知您的医生或护士。预防脱水很重要。增加液体摄入，同时服用易蒙停（洛哌丁胺，止泻药）。</p>

静脉刺激

如果药物渗出血管外，会引起静脉周围组织的刺激。相应的症状包括不舒服，红肿和刺激感。如果您在治疗期间或治疗结束后发现进针处或周围有任何异样，请立即告知您的护士。

如果您感觉很不舒服或发生任何严重不良反应，即使这些反应上述没有提到，请您立即直接告诉您的医生，这点非常重要。

Reference: Treatment and Chemotherapy Administration Resource For The Adult Patient.. Cancer Maine Medical Center.